

Palma Botella



MANEJO DE LA SEMILLA

Almacenamiento: La semilla se considera ortodoxa. Almacénela con un contenido de humedad del 10%, a temperatura en cuarto frío de 4°C, o conserve en lugares frescos y bien ventilados. **Tratamiento pre germinativo:** sumerja la semilla en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. Semilla de lenta germinación, normalmente supera los 30 días, dependiendo de las condiciones del sitio de germinación

PRODUCCIÓN EN VIVERO

En general se recomienda el sistema tradicional, es necesario realizar a las semillas el tratamiento pre germinativo prescrito y sembrarlas tan superficial como sea posible, sin que el riego las destape; desinfectar el sustrato de los germinadores, o usar turba. En todos los casos se deben proteger los germinadores de la lluvia directa para evitar encharcamientos y aparición de problemas sanitarios, para esto se recomienda el uso de plásticos translúcidos al menos a 80 cm de altura; las polisombras no son efectivas debido a que dejan pasar el agua de la lluvia. Mantenga húmedo el sustrato durante la germinación, sin exceso o deficiencia de agua, utilice implementos de gota muy fina para que no se destape la semilla. La última fase de la producción en vivero es la etapa de crecimiento, desarrollo y endurecimiento después del trasplante, este periodo es variable y debe ser lo suficientemente largo, como para que las palmitas alcancen altura de llevar a campo.