



Fuente: http://www.toptropicals.com/cgi-bin/store/store.cgi?first_mid=1152

Mamey, (*Mammea americana* L.)

CONDICIONES DE ADAPTACIÓN

Altitud: 0 a 1.400 metros sobre el nivel del mar. **Clima:** Es una planta de climas Calido y humedo. Su temperatura está entre los 20 ° y 28 °C. Precipitaciones mayores a 1.500 mm al año bien distribuidas. **Suelos:** Ricos en nutrientes y profundos, texturas francas, pH 5.1 a 7.8.

MANEJO DE LA SEMILLA

Almacenamiento: Se debe sembrar lo mas pronto posible después de ser beneficiada del fruto.

Tratamiento pregerminativo: Sumergir en agua por 24 horas. **Numero de semillas por kilo: 20. Plántulas en vivero:** Plántulas reales promedio por kilogramo de semilla: mínimo **10**. La germinación sucede entre los 40 a 260 días.

PRODUCCIÓN EN VIVERO

Para la producción en vivero se siguen en general las siguientes actividades:

Siembra de la semilla:

Sistema de siembra: Por semilla se siembran directamente en bolsa, ya que la especie no es muy resistente al trasplante. En semilleros se siembra en surcos distanciados 10 cm. El trasplante se hace cuando la plántula tenga entre 15 y 20 cm.

- Utilice la semilla inmediatamente, no la exponga al calor, sol o humedad conserve la identificación.
- Aplique el tratamiento pregerminativo indicado.
- Sustrato de germinación: Para cantidades pequeñas se recomienda **Turba** para evitar la desinfección de sustrato; en cantidades mayores se prepara un sustrato de una (1) parte de tierra por tres (3) de arena. No use fertilizantes, gallinaza ni humus para la germinación.
- Desinfección del sustrato: Formol: Un (1) litro por metro cuadrado al 20% de concentración o Basamid 50 g por m² aplicado con el sustrato húmedo; en ambos casos se cubre 4 días con un plástico, luego se remueve por 3 días o más hasta que desaparezca el olor. La profundidad del sustrato no debe ser mayor de 15 cm
- Siembre tan superficial como sea posible, sin que la semilla quede expuesta al aire o la destape el riego.
- Riego: Mantenga húmedo el sustrato durante la germinación, sin exceso o deficiencia de agua, utilice implementos de gota muy fina o nebulización para que no se destape la semilla.
- Proteja la germinación de las condiciones del medio como lluvias fuertes, exceso de sol o calor, roedores o pájaros; el uso opcional de sombra moderada, mejora las condiciones de germinación. Para optimizar la germinación y disminuir la dependencia del riego y a la vez proteger de los cambios ambientales o la desecación prematura del sustrato, una vez realizada la siembra, es conveniente cubrir las eras de germinación con una lona de polipropileno color verde del tipo usado en las construcciones; esta lona permeable se coloca sobre el germinador inmediatamente después de la siembra y se deja hasta que se inicie la germinación. El riego se puede aplicar por encima de la lona. La práctica es sencilla, económica y muy beneficiosa para la producción.
- En todos los casos se deben proteger los germinadores de la lluvia directa para evitar encharcamientos y aparición de problemas sanitarios, se recomienda el uso de plásticos traslucidos al menos a 80 cm de altura, las polisombras no son efectivas debido a que dejan pasar el agua de la lluvia.

Trasplante

Las plántulas se mantienen en el semillero cuando poseen una altura de 15 a 20 cm. Se trasplantan a bolsas donde permanecen alrededor de 3 a 5 meses; cuando se procede a trasplantarlas a bolsas y se siguen las siguientes actividades:

- Se coordina el llenado de bolsas con tierra fértil y cascarilla en una proporción del 20%, se establece una malla sombra mínima del 65%, indispensable para el trasplante.
- Para el trasplante, se extraen las plántulas una a una protegiendo la raíz del aire y del sol, se pueden colocar en un balde con agua fresca, sumergida únicamente la raíz, se toman una a una sin presionar el tallo ni la raíz, y se colocan en un hoyo hecho con

una estaca en el centro de la bolsa, (con el sustrato húmedo), con las raíces extendidas hacia abajo y rectas; este es el momento de aplicación de micorrizas, las cuales se colocan en contacto con la raíz aplicando de 5 a 10 g por bolsa.

- Recipiente para trasladar las plántulas bien protegidas y sombra durante el trasplante.
- Trasplante: bajo sombra se hace un hoyo profundo y central con el sustrato húmedo y postura de la plántula sin torcer la raíz.
- El trasplante debe hacerse obligatoriamente bajo sombra usando malla sombra o materiales similares, (no debajo de árboles porque entre luz lateralmente), se dejan dos semanas, y luego se exponen lentamente a plena luz para que crezcan y rustifiquen.
- El riego debe hacerse a diario después del trasplante, de preferencia en las primeras horas del día o en las últimas de la tarde.
- Una vez trasplantadas algunas plántulas, toman un aspecto poco vigoroso, con apariencia deshidratada o agachadas, lo cual es normal los primeros días.
- La última fase de la producción en vivero es la etapa de crecimiento y desarrollo después del trasplante. Este periodo es variable y se debe garantizar que los árboles alcancen una altura entre 40 y 50 cm para llevar a campo, esto puede ocurrir entre 3 y 5 meses después de la emergencia de la semilla.

INFLUENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Cephaleuros virescens (Mancha algacea) Son manchas filamentosas de diferentes colores (desde gris hasta amarillas) que parecen corresponder a crecimientos de algas y líquenes. En Colombia se ha colectado en Santa fe de Antioquia.

Gloeosporium : *Manchas de forma irregular, de color gris con pequeños puntos negros en el centro y su tamaño de varios cm. No presenta setas. Este hongo es el estado imperfecto o asexual de Glomerella.*

Comejen : Se come la madera almacenada y además los objetos hechos con ella.

INFORMACION ADICIONAL

Su madera es utilizada en la ebanistería y en la construcción. De su almendra se extrae un aceite que sirve para evitar la caída del cabello (Mahecha et al. 2004). Según los jardines botánicos Joaquín Antonio Uribe de Medellín, Eloy Valenzuela de Floridablanca Santander, Quindío y San Jorge de Ibagué es una especie ornamental útil en el espacio público para generar sombra en jardines y parques. Es alimenticia, su fruto se consume fresco, en conservas, dulces y natillas. Según el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe es útil en la producción de vino, es medicinal vulnerario, antihelmíntico y febrífugo, es usado contra los parásitos de la piel. Sus hojas y semillas se usan como insecticida.

Fuentes:

<http://www.fs.fed.us/global/iitf/Mammeaamericana.pdf>



<http://www.unalmed.edu.co/~crsequed/MAMEY.htm>

<http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Archivos/Publicaciones/Frutalestropicalescartilla.pdf>

<http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/especie.do;jsessionid=EB319A106676059821B6C2793379E3E6?idBuscar=1137&method=displayAAT>

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/PUIRNA/INF-2005-020.pdf



El semillero®
...su aliado forestal