

www.elsemillero.net

DOSIS SUGERIDAS

Establecimiento de plantaciones forestales
2-3 g por árbol al momento de plantación

En árboles establecidos:
Hasta de 50 cm. - 5 g.; de más de 1 m 10 g.,
se aplica en 3 hoyos alrededor del tallo a
una profundidad de 20- 25 cm., los hoyos
se cubren con la misma tierra.

En vivero
70 g por metro cuadrado de germinador de
no más de 15 cm de alto.

En invernaderos
1kg. por m3 de sustrato disminuye en
20-30% el riego.

Poliacrilamida Potasica de multiples enlaces
Para cultivos establecidos dosis de acuerdo a
requerimientos hídrico

DISTRIBUIDO POR:



El semillero®
...su aliado forestal

elsemillero@elsemillero.net
PBX: (+57) (1) 347 3760
Calle 70 A No. 14 A - 45
Bogotá, Colombia

HYDROSORB-K

SEMBRANDO AGUA

**La solución económica
para la utilización
eficiente del agua**

GEL HIDRORETENEDOR

Registro de Venta ICA: 10056



HYDROSORB-K es una poliacrilamida hidrorretenedora, de aspecto granular fino que al entrar en contacto con el agua se hidrata convirtiéndose en un gel transparente que actúa como una reserva de agua para las plantas cuando estas así lo requieran.

BENEFICIOS

- Disminuye la mortalidad en la plantación
- Mayor velocidad de retención de agua para reserva a sus plantas, puede estar 100% hidratado en 10 minutos, mejorando la velocidad de absorción del agua de lluvia o riego.
- 1 g hidrata 300 cc de agua en menos de 1 minuto, con entrega de más del 99% al sistema radicular.
- Mecanizable, una vez el producto está hidratado, se puede aplicar con bomba de espalda o maquina estacionaria sin riesgo taponar las boquillas.

APLICACIONES

- Repoblación Forestal
- Césped Deportivo
- Campos de Golf
- Recuperación de Tierras
- Horticultura Comercial
- Agricultura
- Transporte y Almacenamiento de especies perecedoras

Uso en plantas de interior y jardinería

Materas pequeñas (diámetros de 15 a 20 cm.) 1g.; medianas de 20 a 30 cm. 2 g. grandes de 30 a 50 5 g.; Jardineras 20 g. por m2. En ambos casos se puede aplicar en mezcla con la tierra antes de la siembra, o haciendo hoyos y enterrando el producto al rededor de la planta cuando ya esté plantada.

Uso en pastos

Antes de la siembra 20 Kg./ha. Por Ha. en mezcla homogénea durante la preparación del suelo, evitando que quede expuesto en la superficie.

Cultivos industriales:

Caña de azúcar, algodón, maíz, soya, 15-20 kg./ha.

Arveja, maracuyá, frijol de enredadera, curuba, 1-2 g. por planta al momento de la plantación.

Banano 4 g. por planta al momento de la plantación ó 15 g en plantas establecidas.

Hortalizas: 15 a 20 kg./ha. en mezcla homogénea durante la preparación del suelo, evitando que quede expuesto en la superficie.

Papa, yuca, zanahoria: 20 -23 kg. Ha. en mezcla homogénea durante la preparación del suelo, evitando que quede expuesto en la superficie.

Palma Africana: pre vivero: no requiere, en vivero: 5g. por planta. Al momento de siembra aplicar 30 gr/palma (preferiblemente prehidratado)